BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 8 mai 1907.

Présidence de M. P. LESNE.

Distinction honorifique. — M. R. Jeannel est nommé Docteur en Médecine.

Exonération. — M. Gallardo s'est fait inscrire comme membre à vie.

Changement d'adresse. — M. le Dr J. Guiart, professeur à la Faculté des Sciences, 136, quai de la Charité, Lyon (Rhône).

Admission. — M. Paul Boppe, garde-forestier, villa Leonora, boulevard d'Alsace, Pau (Basses-Pyrénées).

— M. Vladimir de Velitchkovsky, Valniki, gouvernement de Woronej (Russie). *Entomologie générale.*

Présentation. — M. Georges Postel, pharmacien, Mailly-Maillet (Somme), présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs : MM. C. Dumont et G.-A. Poujade.

Vote du Prix Constant. — Par suite de retards survenus au cours de l'impression du *Bulletin* n° 6, ce numéro, qui contenait le rapport déposé par M. J. de Joannis au nom de la Commission du Prix Constant, n'a pu être distribué en temps utile pour être porté à la connaissance de tous les membres ayant le droit de voter.

Des réclamations s'étant produites à ce sujet, la Société décide que le vote pour l'attribution de ce Prix sera reporté à la prochaine séance, qui a lieu le 22 mai.

Communications.

Note complémentaire sur le *Rhipiphorus* (*Myiodes*) *subdipterus* Bosc [Col.]

par le Dr A. Chobaut.

Je ferai remarquer tout d'abord que j'adopte, pour ce genre, la synonymie présentée par les auteurs de la dernière édition du *Catalogus Coleopterorum Europae* (1906). Le nom de *Rhipiphorus* Bosc, datant de 1792, a certainement la priorité sur celui de *Myiodes* Latreille (1804) et de *Myodites* de Laporte (1835-1840).

A la suite de la note que j'ai fait paraître ici même, l'an dernier, sur ce Rhipiphoride (*Bulletin de la Soc. ent. de France,* 1906, p. 223), notre aimable collègue, le Dr L. von Heyden, a bien voulu me communiquer quatre exemplaires de cette espèce qui méritent chacun l'honneur de quelques mots.

1° Un sujet ♀ de la Russie méridionale (ex Kindermann) qui se rapporte à la var. *Clermonti* Chob., mais qui, en outre d'une bande flave, transverse, au-devant de base du pronotum, a aussi les côtés de cet organe et sa partie antérieure irrégulièrement maculés d'une bande sinueuse, flave également.

2° Une ♀ de Kendyktau (Turkestan, ex J. Sahlberg) qui correspond très exactement à ce que Solsky a décrit sous le nom de *Rhipidophorus pallescens* (*Trudy,* XIII, 1881-1882, p. 57). Chez cet individu, le pronotum porte deux petites taches flaves au-devant de la base. Aucun autre caractère anatomique ne le distingue de *R. subdipterus* dont il n'est certainement qu'une anomalie de coloration par défaut. Cette ♀ est tout à fait semblable au ♂ que je connais de la var. *Clermonti.* Le nom de *pallescens,* ayant donc la priorité, devra remplacer celui de *Clermonti* que j'avais proposé.

3° Une ♀ de Basilicata (Italie, ex G. Leoni) prise pour un ♂ et portant le nom de *Leonii* Desbrochers *i. l.* Cet individu, en parfait état de conservation, muni de ses deux antennes, est tout à fait semblable aux exemplaires foncés du midi de la France et ne présente aucun caractère pouvant faire penser à une espèce nouvelle, surtout à un ♂.

4° Un dernier exemplaire ♀ pris en 1905 à Oran par le Dr Schmiedeknecht et qui confirme la présence de *R. subdipterus* dans le nord de l'Afrique.

D'autre part, dans la récente édition du *Catalogus Coleopterorum*

Europae, M. E. Reitter appelle *caucasicus* la var. *Clermonti* de *R. subdipterus* et la considère même comme une espèce valable, ce qui est une erreur d'après M. Pic lui-même (*L'Echange*, n° 268, 1907, p. 122).

Quant au *R. syriacus* Pic, que je ne connais pas, je ne puis évidemment pas me prononcer sur sa validité, mais seulement faire remarquer la faiblesse des caractères indiqués par son auteur. D'ailleurs, ce qui tendrait en outre à prouver qu'il n'est qu'une variété, c'est que le type de l'espèce m'est indiqué du Taurus (ex Heyne) par le Dr L. von Heyden et que Gerstaecker le signale aussi d'Asie Mineure.

La faune paléarctique ne comprendrait donc qu'une seule espèce de *Rhipiphorus*, le *subdipterus* Bosc, à pronotum entièrement noir, et la sous-variété ou aberration *pallescens* Solsky, à pronotum noir plus ou moins maculé de flave, à coloration générale plus claire, etc.

La synonymie de cette espèce devrait donc être ainsi rétablie :

subdipterus Bosc, *Journ. d'hist. nat.*, 1792, t. 2, p. 293-296, 1 pl. *Europe méridion.*; *Nord de l'Afrique; Asie Min.*
Dorthesi Latr., *Nouv. Dict. d'hist. nat.*, 1818, p. 130.
Leonii Desbr. *i. l.* (♀ nec ♂).
a. *pallescens* Solsky, *Trudy*, XIII, 1881-1882, p. 57 (♀) *Turkestan; Russie mérid.*
Antoniae Pic, *L'Ech.*, 1905, p. 165 (nec Reitter (♂ ♀) *Caucase.*
Clermonti Chob., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1906, p. 224 (♂ ♀)
caucasicus Reitt., *Catalog. Col. Eur.*, 1906.
? *syriacus* Pic, *L'Ech.*, 1905, p. 165 (♂). *Syrie : Monts Amanus.*

Note sur les Clérides du type *Hendecatus* Schenkl. [Col.]

par Pierre Lesne.

Les Clérides énumérés ci-après ont été considérés jusqu'ici comme constituant des espèces distinctes; ils ont été rangés par les auteurs dans des genres et même dans des tribus différentes. Cependant ils semblent appartenir à une même espèce qui serait le seul représentant

connu de la coupe fondée par S. Schenkling sous le nom d'*Hendecatus* (*Deutsche Ent. Zeitschr.* [1906], p. 246) (1).

1842. *Tillus compressicornis* Klug in *Abhandl. der Kön. Akad. der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1840*, p. 273, pl. II, f. 3.

Cette forme a été ultérieurement placée par Gorham (1876), par Lohde (1900) et par Schenkling (1903) dans le genre *Philocalus* Klug.

1852. *Tillus* (*Macrotelus?*) *subnotatus* Westwood in *Proceed. of the Zool. Soc. of London* [1852], p. 37.

Placé ultérieurement par Lohde (1900) dans le genre *Macrotelus* Klug et par Schenkling (1903) dans le genre *Teloclerus* Schenkl., fondé aux dépens du précédent.

1876. *Phloeocopus pallicolor* Fairmaire in *Pet. Nouv. ent.* II, p. 49.

La description originale est fort insuffisante. L'insecte a été maintenu dans le genre *Phloeocopus* par les auteurs subséquents; nous avons pu l'étudier grâce à l'amabilité de notre confrère M. J. Magnin.

1891. *Macrotelus Belamyi** Fairmaire in *Ann. Soc. ent. Fr.* [1891], p. 247 (2).

Placé ultérieurement par Schenkling dans le genre *Teloclerus* Schenkl.

1898. *Macrotelus maculicollis** Fairmaire in *Ann. Soc. ent. Belg.* [1898], p. 232. — id. var. *subvittatus** Fairmaire in *Bull. Mus. d'Hist. nat.* [1902], p. 306.

Même observation que pour le précédent.

Ces différentes formes devront prendre rang comme il suit dans la nomenclature :

(1) L'établissement du genre *Hendecatus*, basé simplement sur la présence d'un article additionnel aux antennes ne paraît pas suffisamment justifié. On sera amené, sans doute, à le réunir au genre *Teloclerus* décrit par le même entomologiste (cf. Wytsman, *Genera Insectorum*, Cleridae, par S. Schenkling, 1903, p. 9).

(2) Les noms marqués d'un astérique correspondent aux formes dont nous avons vu les *types* faisant actuellement partie du Muséum national d'Histoire naturelle.

Teloclerus (*Hendecatus*) *compressicornis* Klug 1842 (♀); *subnotatus* Westwood 1852 (♀); *Belamyi* Fairmaire 1891 (♂ ♀). — Soudan occidental et méridional; Afrique australe.

var. *maculicollis* Fairmaire 1898 (♂ ♀). — Madagascar.

var. *subvittatus* Fairmaire 1902 (♂ ♀). — Madagascar sud.

subsp. *pallicolor* Fairmaire 1876 (♀). — Sahara algérien et tunisien.

La race *pallicolor* est bien distincte du type; mais elle se reconnaît uniquement à la ponctuation moins forte des stries élytrales. La coloration est généralement très claire et les pattes sont entièrement testacées; cependant on trouve des individus chez lesquels les élytres sont en majeure partie bruns, ce qui fait mieux apparaître leur tache latérale dépigmentée.

Tous les spécimens soudanais examinés par nous sont entièrement roux en dessus (yeux exceptés); la macule latérale de leurs élytres est peu apparente. Il n'en est pas de même chez un exemplaire du Zambèze (coll. du Muséum) dont les élytres sont bruns sauf le long de la suture. Ce spécimen présente en outre cette particularité d'avoir les élytres striés jusqu'au milieu de leur longueur, alors que chez les individus des autres provenances les stries n'atteignent pas tout à fait ce niveau. Les *Hendecatus* malgaches offrent en général sur le prothorax une bande médiane noire et une autre de même couleur sur les flancs; tantôt leurs élytres sont uniformément pâles (var. *maculicollis*), tantôt ces organes sont ornés d'une bande longitudinale discoïdale et d'une autre bande latérale de même couleur, interrompue par la tache marginale (var. *subvittatus*). On trouve aux environs de Diego Suarez des individus entièrement pâles, ne différant pas sensiblement des spécimens soudanais. Les faibles variations que l'on constate dans la longueur du dernier article des antennes, chez le ♂, et dans la densité de la ponctuation de l'apex des élytres, paraissent purement individuelles.

Le ♂ se reconnaît, non seulement au développement insolite du dernier article des antennes, mais aussi à ses yeux plus gros que chez la ♀ et plus rapprochés sur le front. De légères différences peuvent être notées chez les ♂ dans la configuration du bord postérieur du pygidium et du dernier segment ventral qui est tantôt sinué, tantôt tronqué, tantôt arrondi; mais elles ne paraissent pas devoir fournir de caractères spécifiques.

Les *Hendecatus* sont des formes tropicales propres au continent africain et à Madagascar. Bien que répandus dans le Sahara septentrional,

au Soudan et dans l'Afrique australe, ils n'ont pas été signalés jusqu'à présent dans la région guinéenne, région qu'habite leur proche congénère, le *Tel. uniformis* Westw. Ils vivent vraisemblablement aux dépens des Coléoptères térédiles. M. le Dr Normand a en effet observé le *Tel. pallicolor* à Kebilli, dans les galeries d'un Bostrychide, l'*Enneadesmus trispinosus* Oliv., dont il fait sa proie.

Bulletin bibliographique.

Buckton (G.-B.) : Monograph of the British Aphidae, 4 vol. av. pl. col., 1876-82; (Ray Soc.). — Acquis pour partie par la Bibliothèque et partie don de M. J. de Gaulle.

Delcourt (A.) : Quelques observations sur la variabilité de *Notonecta glauca*; (*C. R. Soc. Biol.*) 1907, 3 p.*

Herms (W.) : An Ecological and Experimental Study of Sarcophagidae with Relation to Lake Beach Debris; (*Ohio St. Univ.*), 1907, fig. et pl.*

Kirkland (A.-H.) : Second annual Report of the Superintendent for suppressing the Gipsy and Brown-Tail Moths; Boston 1907, 170 p. et pl.*

Künckel d'Herculais (J.) : Un Diptère viviparе de la famille des Muscides à larves tantôt parasites, tantôt végétariennes; (*C. R. Acad. Sc.*), 1907, 3 p.*

Olivier (E.) : Collections recueillies en Perse par M. de Morgan. Coléoptères : Lampyrides; (*Bull. Mus. Hist. nat.*), 1907, 1 p., 2 exempl.*

Pic (M.) : Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes, VI, 2; St-Amand, 1907, 28 p.*

Pictet (A.). : Des Diapauses embryonnaires, larvaires et nymphales chez les Insectes lépidoptères; (*Bull. Soc. lépidopt. Genève*), 1907, 58 p., fig.*

Id. : Diapauses hibernales chez les Lépidoptères; (*Arch. Sc. phys. nat.*), 1907, 4 p.*

Royer (M.) : Troisième note de Bibliographie; (*Rev. Ent.*), 1906, 1 p.*

Id. : Hémiptères nouveaux ou peu connus de la faune française, 1re note; (*Bull. Soc. ent. Fr.*) 1907, 3 p.*

Id : Quatre nouvelles variétés d'*Eurydema oleraceum* L.; (*loc. cit.*) 1907, 3 p., fig.*

TOWER (W.-L.) : An Investigation of Evolution in Chrysomelid Beetles of the Genus *Leptinotarsa;* (*Carn. Inst. Wash.*) 1906, 320 p., fig. et pl.*

Académie des Sciences (*C. R. hebdom. des séances*), 1907, I, 16-17. ⊙

Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg (*Bulletin*), 1907, 1 à 7. — Dr W. KULCZYNSKI : Araneae et Oribatidae expeditionum rossicarum in insulas Novo Sibiricus annis 1885-1886 et 1900 susceptarum, (texte russe). — E. VON DER BRUGGEN : Zoologische Ergebnisse der Russischen Expeditionen nach Spitzbergen. *Amphipoda*, (texte russe). N. ADELUNG : Verzeichniss der von M. Th. Kalisevsky im Jahre 1905 in Abkhasien gesammelten Orthopteren, (texte russe).

Akademia umiejetnosci w. Krakowie (*Rozprawy*), VI, A et B, 1906. ⊙

Academy of Science of St-Louis (*Transactions*), XV, 6; XVI, 1 à 7, 1906. — TH. L. CASEY : Observations on the Staphylinid Groups Aleocharinae and Xantholinini, Chiefly of America.

Annals and Magazine of Natural History (*The*), Mai 1907. — T.-D.-A. COCKERELL : Descriptions and Records of Bees, XIII. — C. CHILTON : A new Freshwater Gammarid from N. Zealand, (pl.). — W.-L. DISTANT : Rhynchotal Notes XLII, (fig.). — G.-J. ARROW : Some new Species and Genera of Lamellicorn Coleoptera from the Indian Empire, II, (fig.). — E. AUSTEN : A new Genus and Species of Phlebotomic Muscidae from Aden.

Entomologist's monthly Magazine (*The*), mai 1907. — J.-H. KEYS : *Exaleochara* a Genus of Coleoptera new to Science. — G.-C. CHAMPION : *Aleochara discipennis,* Muls. et Rey : a British Insect. — E.-A. NEWBERY : *Enicmus fungicola,* Thoms., a species of Coleoptera new to Britain. — E.-R. BANKES : *Exartema latifasciana,* Hw. ab. *vineana* n. ab. — N.-M. RICHARDSON : The migration of aquatic Hemiptera. — K.-J. MORTEN : The British *Plecoptera* (*Perlidae*).

Entomologische Zeitschrift, XXI, 1907 ; n° spécimen. — H. MARSCHNER : Lepidopteren der Görlitzer Heide (Umgebung von Kohlfurt und Waldan o. L.). — V. CALMBACH : Ex ovo-Zucht *Arctia flava* und *Pericallia matronula.* — L. BAYER : *Ocnogyna parasita* Hb. — Die Bedeutung des Dimorphismus in der Farbe der Puppe von *Papilio machaon.*

Fauna. — *Société des Naturalistes Luxembourgeois,* XVI, 1906. — H. Mullenberger : Beiträge zu der Schmetterlingskunde des Luxemburger Landes, (2 art.). — E. Feltgen : Notices sur les Araignées, (2 art.) (fig.).

Feuille des Jeunes Naturalistes (*La*), 1er mai 1907. — J. Chalande : Contribution à la faune des Myriopodes de France. — G. Goury et J. Guignon : Les Insectes parasites des Crucifères. — J. de Gaulle : Catalogue des Hyménoptères de France. — Notes spéciales et locales.

Illinois State Laboratory of Natural History (*Bulletin*), VII, 8-9, 1907. — ⊙

R. Accademia dei Lincei (*Atti*), 1907, I, 7. ⊙

Revista agronomica, V; 2, 1907. ⊙

Royal Dublin Society. — 1° *Economic Proceedings,* I, 9, 1907. ⊙. — 2° *Scientific Proceedings,* XI, 13 à 15, 1907. — *Scientific Transactions,* IX, 4-5, 1907. ⊙

Royal Society. — 1° *Reports of the Commission,* V à VII, 1907. — Investigation of Mediterranean Fever under the supervision of an Advisery Committee. — 2° *Proceedings* A, 79, 528. ⊙

Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales (*Boletin*), VI, 2-4, 1907. ⊙

Societas Entomologica, XXII, 3, 1907. — A. Grunach : Die Dorcadionen Griechenlands, der Balkanländer und Kleinasiens. — M. Gillmer : Refer at ueber den ersten Band von J. W. Tutt's Natural History of the British Butterflies, etc.

Société Lépidoptérologique de Genève (*Bulletin*), I, 2, 1906. — P. Denso : Contribution à l'étude des Sphyngides hybrides paléarctiques. — A. Pictet : Des Diapauses embryonnaires, larvaires et nymphales chez les Insectes Lépidoptères. — M. Rehfous : Note sur *Scirpophaga praelata.* — P.-A.-H. Muschampt : La variation restreinte à un seul sexe. — J. Culot : Aberration et variétés nouvelles. — J. Jullien : *Arge* (*Melanargia*) *galathea* L. ab. *vispardi* Jull. — P.-A.-H. Muschampt : *Papilio Alexanor,* Esp. ab. *cincta* Musch. — Un hermaphrodite de *Malacosoma alpicola.* — J. Reverdin : Aberrations de Lépidoptères. — 5 pl.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.